

LES PRÉCAUTIONS «STANDARDS»



Ces précautions sont à respecter systématiquement, par tout soignant, lors de tout soin, pour tout patient quelque soit son statut infectieux.



→ HYGIÈNE DES MAINS (SHA OU LAVAGE)

- > Après le retrait des gants
- > Entre 2 patients
- > Entre 2 activités
- > Entre 2 gestes de soins différents chez un même patient.



→ PORT DE GANTS

- > Lors de contact avec le sang et/ou les liquides biologiques
- > Lors de contact avec la peau lésée du patient
- > Lors de la manipulation de tubes de prélèvements biologiques
- > Lors de la manipulation de linge et matériel souillé
- > Lors de tout soin en cas de lésions sur les mains du soignant.



→ PORT DE SURBLOUSE, LUNETTES ET MASQUE

- > Lors des actes entraînant des risques de projections de sang et/ou liquide biologique (ex.: aspiration).



→ PIQUANT – TRANCHANT

- > Sont à éliminer IMMÉDIATEMENT et SANS AUTRE MANIPULATION dans le collecteur d'aiguilles.



→ SURFACES SOUILLÉES

- > Nettoyer et désinfecter les surfaces souillées de sang et/ou liquides biologiques au détergent-désinfectant (Application des procédures de bio nettoyage).



→ TRANSPORT DE PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES, LINGE ET MATÉRIELS SOUILLÉS

- > Respecter les emballages prévus au transport des diverses catégories de matériel (Application procédures élimination des déchets et prise en charge du linge).



→ CONTACTS AVEC DU SANG OU DES LIQUIDES BIOLOGIQUES

- > Respecter la procédure de désinfection dans le cadre des AES (Application procédure AES).

Imprimé Par Nos Soins.

11 centres
à proximité de votre entreprise



Nous contacter

| MANCHE

Cherbourg : 02 33 44 29 09
Valognes : 02 33 95 20 14
Carentan : 02 33 71 97 71
Saint-Lô : 02 33 57 12 93
Torigny : 02 33 55 66 59
Coutances : 02 33 76 67 20
Granville : 02 33 90 83 11
Avranches : 02 33 68 26 87
Saint-Hilaire-du-Harcouët : 02 33 49 38 10

| CALVADOS

Vire : 02 31 66 27 07

| ORNE

Flers : 02 33 65 26 87

La coqueluche est une maladie hautement contagieuse, grave chez les sujets à haut risque.

*Elle se transmet par voie aérienne.
La prévention passe par la vaccination,
par le respect des précautions, et par une sensibilisation au diagnostic.*

© SIST Ouest Normandie

Service Interprofessionnel de Santé au Travail Ouest Normandie

CS 43509 - 107, Rue Auguste Grandin - 50009 SAINT-LÔ Cedex
Tél.: 02.33.57.12.93 - www.santetravail-on.fr

LA COQUELUCHE DANS LES STRUCTURES DE SOINS

Maladie contagieuse, due à une bactérie.
Contamination par gouttelettes
(toux, éternuement).



Service Interprofessionnel
de Santé au Travail Ouest Normandie
www.santetravail-on.fr



Le vaccin, tout comme la maladie
ne protège pas à vie.

Les populations les plus touchées sont les
nourissons non vaccinés et les adultes qui ont
perdu leur protection vaccinale ou naturelle.

Février 2022

DÉFINITION, TRANSMISSION ET PRISE EN CHARGE

→ SUJETS À HAUT RISQUE

Nourrissons incomplètement ou non vaccinés, sujets atteints de maladies respiratoires chroniques, femmes enceintes (risque d'accouchement prématuré) parents de nourrissons non encore vaccinés (2/3 des enfants sont contaminés par leurs parents).

→ SYMPTÔMES

Toux caractéristique (quinteuse, spasmodique, cyanosante) à prédominance nocturne, persistante au delà de 7 jours, peu ou pas de fièvre.

→ DIAGNOSTIC

Basé sur la clinique et confirmé par la biologie.

→ CONTAGIOSITÉ

- > Maladie **hautement contagieuse**.
- > Contamination par gouttelettes (toux, éternuement).
- > **Contagiosité maximale pendant la 1^{ère} semaine**, dure jusqu'à 3 semaines après le début des signes cliniques ; négative après 5 jours de traitement adapté.

→ PRISE EN CHARGE DU OU DES CAS

> Traitement antibiotique.

Si le cas est un patient :

Précautions complémentaires gouttelettes

Pendant les 5 premiers jours qui suivent la mise en place du traitement.

Si le cas est un salarié :

Éviction d'au moins 5 jours avec un traitement adapté.

→ PRISE EN CHARGE DE L'ENTOURAGE DU OU DES CAS

- > Antibioprophylaxie des sujets à haut risque (Cf introduction).
- > **Vaccination ou revaccination du personnel**, ou des proches.

LES PRÉCAUTIONS «GOUTTELETTES»...

...EN COMPLÉMENT DES PRÉCAUTIONS «STANDARDS»

La mise en oeuvre des précautions complémentaires et leur interruption, doivent faire l'objet : d'une prescription médicale, d'une signalisation dans le dossier de soins, d'une information auprès du patient et de sa famille.

PORT DE MASQUE CHIRURGICAL



- > Pour le soignant et les visiteurs dans un rayon de 1.5 mètre autour du patient, porté en permanence dans la chambre.
- > Pour le patient dès qu'il quitte sa chambre.

CHAMBRE INDIVIDUELLE

- > Installation du patient en chambre individuelle (ou regroupement dans une même chambre de patients atteints par le même micro organisme).
- > La porte de la chambre doit être fermée. La chambre doit être aérée régulièrement (fenêtre).

RENFORCEMENT DE L'HYGIÈNE DES MAINS



- > Désinfection des mains par friction hydro alcoolique après lavage simple ou lavage hygiénique des mains, systématiquement à la sortie de la chambre.
- > Pour le soignant, le patient, les visiteurs.

MATÉRIEL

- > Privilégier l'utilisation du matériel à usage unique ou réserver le matériel exclusivement au patient.

LE LINGE SALE ET LES DÉCHETS



- > Sont stockés dans la chambre dans des conditionnements adaptés.
- > Sont évacués sous double emballage.

ENTRETIEN DE LA CHAMBRE

- > Terminer toujours le ménage par la chambre infectée.
- > Matériel de ménage à usage unique évacué dans les déchets infectieux (bacs jaunes), matériel de ménage réutilisable nettoyé / désinfecté.